

Hoe voorkom je dat paardenkastanjabomen in de vroege nazomer reeds massaal blad verliezen door aantasting van de mineermot?

STAP 1 Ruim in de herfst zo goed als mogelijk alle afgevallen bladeren op

Verzamel de aangetaste bladeren en voer deze af naar een professionele composteringsplaats. Poppen van deze mineermot, die in deze afgevallen bladeren aanwezig zijn, worden zo via compostering vernietigd. Opruimen van afgevallen bladeren in de lente is minder interessant. De bladeren zijn dan reeds grotendeels verrot, en poppen van de mineermot vallen ter plaatse tijdens opruimingswerkzaamheden massaal uit het blad op de grond. Dan heeft een opruimactie uiteraard géén baat gehad. **Zo vroeg als mogelijk na de bladval aangetaste bladeren ruimen is de boodschap !!**

STAP 2 Monitor en beheers de nieuwe generatie mineermotten, die voortkomen uit de restpopulatie overwinterde poppen op de grond, door middel van een specifiek feromoon in vangbekers



+ 4x



+



1) Ten laatste tegen 10 april de vangbekers ophangen met bijhorend feromoon disperser (= wit zakje met opschrift “*Cameraria ohridella*”) erin.

Hiermee wordt de beginpopulatie van de 1^e generatie mineermotten beheerst.

Gelijktijdig brengt men ook **een lijmband** aan **rond de stam** van paardekastanje. Deze band laat men vervolgens de ganse zomer rond de boomstam hangen.

2) De feromoon dispenser vervolgens om de 6 weken vervangen in de vangbekers.

a. Tweede feromoonampule wordt dus omstreeks eind mei aangebracht

b. Derde feromoonampule wordt dus omstreeks half juli aangebracht

c. Vierde feromoonampule wordt dus omstreeks eind augustus aangebracht

Deze opeenvolgende feromoonampules reduceren achtereenvolgens álle voorlopers, piekmomentontluikers én nakomers in de 3 opeenvolgende generaties mineermot.

UITERAARD HOUDT STORIX U VIA DE MAIL OP DE HOOGTE WANNEER DE FEROMONEN VERWISSELD DIENEN TE WORDEN

3) Vanaf half oktober haalt men alles terug uit bomen en ruimt men afgevallen blad op

STORIX Boom- & Landschapsbeheer



Is dit het probleem?



Zware bladbeschadiging reeds in de maanden mei en juni?



Vervroegde bladval in de zomermaanden juli en augustus?



Dan heeft Storix de volgende oplossing:

Door inzet van specifieke feromonen met vangbekers, **in combinatie met bladruiming in de herfst**, is de bladschade goed te beheersen.

Zo zijn de paardekastanjes in staat om op een normale manier hun fotosynthese verder te zetten tot in de nazomer. Het energie niveau van de bomen blijft op peil, wat hun vitaliteit en ziekteverstand verbetert.

STORIX Boom- & Landschapsbeheer

